

AVERTISSEMENTS agricoles



GRANDES CULTURES

BULLETIN TECHNIQUE N° 12 DU 26 JUIN 1991

- POIS** : - Botrytis : premiers symptômes
→ 2ème fongicide
- Pucerons) rares
- Tordeuses)
- BLE** : - Pucerons épis : rares
- MAIS** : - Pucerons : nuls
- LIN** : - Toujours pas de Thrips
- COLZA** : - Alternaria : rare
- BETTERAVE** : - Jaunisse : déjà quelques symptômes

POIS

SITUATION :

Stades : Fleurs nombreuses et feuillage abondant à cause des pluies. Formation des premiers étages de gousses, qui tardent à se remplir. Ce qui retarde d'au moins 8 à 10 jours les premières récoltes de pois de conserve.

Botrytis : Les premiers symptômes sont visibles sur fleurs passées et jeunes gousses. Plus fréquents sur type "feuillus" que sur "afila". **Le risque est maximum.**

Pucerons verts : Toujours rares mais progressent. A surveiller.

Tordeuses : Les toutes premières captures sont notées. 2 papillons seulement à St Pierre-brouck ! Il y a beaucoup de retard dans le développement de ce ravageur, ce qui est confirmé dans toutes les régions (Centre, Picardie, Champagne, etc...). Le risque semble très limité pour les pois protéagineux cette année.

PRECONISATION :

2ème intervention fongicide vivement conseillée à réaliser 10 à 15 jours après le premier traitement.

Insecticide non justifié.

BLE

SITUATION :

Stade : Floraison atteinte pour la majorité des parcelles, sauf variétés tardives.

Pucerons des épis : Premières colonies avec des taux d'infestation très faibles (partout inférieurs à 1 % des épis touchés).

ministère de l'**agriculture** et de la **forêt**



D.R.A.F. - S.R.P.V.
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

P265

Abonnement
annuel :
A l'ordre
Régisseur de Recettes
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais
ISSN 0756-7968 - CPPAP N°1065 AD

Rappel : Le seuil de traitement est de 1 épi sur 2 colonisé.

Maladies : Rien de nouveau. La Rouille Brune est toujours absente.

PRECONISATION :

Terminer les protections fongicides sur variétés tardives. Viser avant tout la Septoriose.

Insecticide inutile.

MAIS

SITUATION :

Stade 6-8 feuilles, difficilement atteint pour les premiers.

Pucerons absents.

PRECONISATION :

Desherbages de post perturbés par les pluies.

Attention pour les produits à base de bromoxynil phénol. Le stade 6 feuilles est souvent le stade limite de traitement pour le maïs.

Pas d'intervention insecticide.

LIN

SITUATION :

Floraison retardée.

Thrips absents.

COLZA

SITUATION :

Alternaria : rare. Risque faible.

BETTERAVE

SITUATION :

Pucerons : Stable par rapport à la semaine dernière.

Premiers symptômes de Jaunisses : Observés (rares). Exemple : notre parcelle d'essai à Loos-en-Gohelle).

PRECONISATION :

Une dernière intervention aphicide a déjà dû être effectuée.

